

**Шкала Глазго для определения степени угнетения сознания  
(Дж.Тисдейл, Б.Дженнет, 1974) (3)  
Соответствие баллов традиционным терминам**

Суммарная оценка по шкале Глазго в баллах	Традиционные термины
15	ясное сознание
13-14	оглушение
9-12	сопор
4-8	кома
3	смерть мозга

Методические рекомендации составлены на основе: Клинические рекомендации (прото-

## Значение шкалы комы Глазго...

### **Интерпретация полученных результатов**

- 15 баллов – сознание ясное
- 10-14 баллов – умеренное и глубокое оглушение
- 8-10 баллов – сопор
- 6-7 баллов – умеренная кома
- 4-5 баллов – терминальная кома
- 3 балла – гибель коры головного мозга

### **Модифицированные шкалы**

Существует несколько вариантов шкалы Глазго. Одна из них – детская шкала комы.

#### **Детская шкала комы**

- Для детей младше 4-х лет – подобна шкале для взрослых за исключением оценки вербального ответа.

#### **Открытие глаз (E)**

- Произвольное – 4 балла
- Реакция на голос – 3 балла
- Реакция на боль – 2 балла
- Реакция отсутствует – 1 балл

#### **Речевая реакция (V)**

- Ребенок улыбается, ориентируется на звук, следит за объектами, интерактивен – 5 баллов
- Ребенка при плаче можно успокоить, интерактивность неполноценная – 4 балла
- При плаче успокаивается, но ненадолго, стонет – 3 балла
- Не успокаивается при плаче, беспокоен – 2 балла
- Плач и интерактивность отсутствуют – 1 балл

#### **Двигательная реакция (M)**

- Выполнение движений по команде – 6 баллов
- Целесообразное движение в ответ на болевое раздражение (отталкивание) – 5 баллов
- Отдергивание конечностей в ответ на болевое раздражение – 4 балла
- Патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение (декортикация) – 3 балла
- Патологическое разгибание в ответ на болевое раздражение (децеребрация) – 2 балла
- Отсутствие движений – 1 балл

**Шкала Глазго** – шкала для оценки степени нарушения сознания и комы детей старше 4-х лет и взрослых. Шкала состоит из трех тестов, оценивающих реакцию открывания глаз (E), а также речевые (V) и двигательные (M) реакции.

За каждый тест начисляется определенное количество баллов. В тесте открывания глаз – от 1 до 4, в тесте речевых реакций – от 1 до 5, а в тесте на двигательные реакции – от 1 до 6 баллов. Таким образом, минимальное количество баллов – 3 (глубокая кома), максимальное -15 (ясное сознание).

## Открывание глаз (E, Eye response)

- Произвольное
- Реакция на голос
- Реакция на боль
- Реакция отсутствует

## Речевая реакция (V, Verbal response)

- Больной ориентирован, быстро и правильно отвечает на заданный вопрос
- Больной дезориентирован, спутанная речь
- Словесная «окрошка», ответ по смыслу не соответствует вопросу
- Нечленораздельные звуки в ответ на заданный вопрос
- Отсутствие речи

## Двигательная реакция (M, Motor response)

- Выполнение движений по команде
- Целесообразное движение в ответ на болевое раздражение (отталкивание)
- Отдергивание конечности в ответ на болевое раздражение
- Патологическое сгибание в ответ на болевое раздражение (декортикация)
- Патологическое разгибание в ответ на болевое раздражение (децеребрация)
- Отсутствие движений