


Утверждаю  
Главный врач БУЗ Орловской  
области «Ливенская ЦРБ»  
 В.А.Сезин

## АЛГОРИТМ

### для медицинского работника при обращении пациента с укусом клеща

1. Для удаления присосавшегося к телу клеща пациента направляют к врачу-хирургу.
2. Во всех случаях контакта клеща с кожей, медицинским работником подается экстренное извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Орловской области в г.Ливны.
3. Извлеченного клеща направляют в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Орловской области в г.Ливны, для исследования на наличие возбудителей инфекционных болезней (обследование платное, за счет средств пациента).
4. Медицинский работник первого контакта назначает пациенту экстренную профилактику боррелиоза (антибиотики: ампицилин 0,5 4 раза в сутки в течение 5 дней; для детей – в возрастной дозировке; доксицилин 1 капсула (0,1г) – 2 раза в день в течении 1 дня, затем 1 капсула 1 раз в день в течении 4 дней.
5. Пациента информируют о необходимости обращения к терапевту или инфекционисту в случае появления симптомов инфекционного заболевания.
6. При появлении симптомов заболевания (кольцевая эритема, лихорадка, и др.) необходимо провести обследование на YgM к боррелиям, но не ранее, чем через 3 недели после укуса клеща.
7. Если при исследовании клеща выявлены боррелии, а профилактика была проведена сразу же после укуса клеща (не позднее 5-го дня) и по полной схеме, то повторно курса антибиотикотерапии не требуется.
8. Если профилактика не проводилась, то необходимо направить пациента к инфекционисту или терапевту.

Подготовила заведующая инфекционным отделением  
Гаврилова И.Е.  
12.04.2018г.